

殺虫剤 コルト[®] 顆粒水和剤

有効成分：ピリフルキナゾン 20.0%
毒性：普通物

特長

① 新しいタイプの殺虫剤

昆虫の行動を制御する(IBR)
これまでにない殺虫剤です。

② 抵抗性を持つ害虫に有効

既存薬剤に対して感受性の
低下した害虫に対しても有効です。

③ カメシ目害虫・チャノキアザミウマ防除に効果的

アブラムシ類、コナジラミ類、カイガラムシ類、
チャノキアザミウマなどの害虫に対して特に有効です。

④ 速効的な摂食阻害作用

速やかに吸汁行動に影響を及ぼし、
高い摂食阻害作用を示します。

⑤ 天敵や有用昆虫に優しい

天敵類への影響が少ないため、
IPMでの活用に適しています。

適用病害虫および使用方法

<2010年10月現在の登録内容>

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ピリフルキナゾンを含む農薬の総使用回数			
かんきつ	アブラムシ類	4000倍	200~700ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内			
	チャノキアザミウマ コナカイガラムシ類	3000倍								
	ヤノネカイガラムシ	2000~3000倍								
	アカマルカイガラムシ	2000倍								
りんご	アブラムシ類	3000~4000倍								
なし	アブラムシ類	4000倍								
	クワコナカイガラムシ	3000~4000倍								
もも ネクタリン	アブラムシ類	4000倍								
かき	フジコナカイガラムシ	2000~3000倍								
ぶどう	コナカイガラムシ類 チャノキアザミウマ	3000倍								
茶	クワシロカイガラムシ	2000~3000倍	1000ℓ/10a	摘採7日前まで	2回以内	散布	2回以内			
	チャノミドリヒメヨコバイ チャノキアザミウマ		200~400ℓ/10a							
ばれいしょ	アブラムシ類	4000倍	100~300ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内			
いちご	アブラムシ類	3000~4000倍								
	コナジラミ類	4000倍								
トマト ミニトマト なす	アブラムシ類 コナジラミ類	4000倍								
ピーマン	コナジラミ類	4000倍								
きゅうり	アブラムシ類	3000~4000倍						2回以内	3回以内	3回以内
キャベツ										
レタス 非結球レタス										

注意事項

- 植物体への浸透移行による効果は弱いので、かけ残しのないように葉の表裏に十分散布してください。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
 - ① ミツバチやその巣箱及びその周辺にかからないようにしてください。
 - ② 受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさけてください。
 - ③ 養蜂が行われている地区では、周辺への飛散に注意する等、ミツバチの危害防止に努めてください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめ使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。

- 使用中に身体に異常を感じた場合には医師の手当を受け、また、誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。
- 眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当てを受けてください。
- 散布の際は農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに洗眼してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼす恐れがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。

● 使用前にはラベルをよく読んでください。 ● ラベルの記載内容以外には使用しないでください。 ● 本剤は小児の手の届くところには置かないでください。 ● 使用後の空袋等は圃場などに放置せず、適切に処理してください。



日本農薬株式会社

東京都中央区日本橋1丁目2番5号

ホームページアドレス <http://www.nichino.co.jp/>